

بیماری‌های انسداد روده‌ای:

عوامل مختلفی می‌توانند باعث انسداد روده‌ای شوند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- آترزی یا تنگی روده:

این عارضه در نوزادان دیده می‌شود و علائم آن عبارت است از عدم وجود مدفوع و اتساع محوطه شکمی

2- پیچ خوردگی روده کوچک و بزرگ حول ریشه

مزانتریک:

این عارضه در همه نشخوارکنندگان و مخصوصاً در نوزادان دیده می‌شود و علائم آن عبارت است از دل درد، اتساع سریع محوطه شکمی، کلاپس و شوک

3- توهم رفتگی روده:

این عارضه در همه نشخوارکنندگان و در روده کوچک و بزرگ نوزادان و روده کوچک بالغین دیده می‌شود. علائم آن عبارت است از دل درد، از دست دادن آب بدن، موکوس به همراه خون در مدفوع قرمز رنگ، اتساع کند محوطه شکمی، کاهش مقدار دفع مدفوع، لمس توده توهم رفته و لمس روده‌های متسع از طریق توشه رکتال.

4- اتساع و پیچ خوردگی سکوم:

این عارضه بیشتر در گاوهای بالغ شیری و در اوایل آن بروز می‌نماید. علائم آن عبارت است از دل درد ملایم تا شدید، اتساع شکم خصوصاً ناحیه فوقانی راست، صدای زنگی در ناحیه تهیگاه سمت راست و لمس سکوم متسع از طریق توشه رکتال.

5- تومورهای روده ای:

این عارضه بیشتر در گوسفندان و کمتر در گاوان رخ می دهد.

6- نکروز چربی مزانتریک:

این عارضه در گاو بروز می نماید. علائم عبارت است از لمس توده های نکروز چربی، کاهش پیشرونده وزن، کاهش یا فقدان مدفوع و لمس اتساع روده از طریق توشه رکتال

7- فلجی روده یا شبه انسداد یا ایلئوس:

این عارضه در همه نشخوارکنندگان رخ می دهد و علائم عبارتند از کاهش یا فقدان مدفوع، صدای زنگی طرف راست محوطه شکمی، مایعات قابل تموج در ناحیه راست که غالباً با آماس صفاق همراه است.

درمان:

در اکثر موارد تنها راه اصلی درمان عبارت است از انجام عمل جراحی و رفع عامل انسدادکننده.

همچنین می بایست اقدام به برقراری موازنه الکترولیتی کرد. به علت از دست دادن کلر و پتاسیم و ایجاد آلكالوز از محلول کلروسدیم 0/9 درصد به همراه 30 میلی اکی والان در لیتر کلروپتاسیم استفاده می شود که پس از رفع عامل انسداد هم می بایست ادامه پیدا کند.

Telegram:@coowman