

متريت عفونى (تورم رحم عفونى)

Septic Metritis

از جمله عوامل بوجود آورنده متريت عفونى مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

- ۱- **جفت ماندگى:** اگر حتى تکه اى کوچک از جفت در داخل رحم باقى بماند در اثر کارکرد عوامل باکتریایى مي‌تواند باعث بوجود آمدن متريت شود.
- ۲- **خروج ديرتر از موقع پلاسنٲا:** يعنى جفت کاملاً خارج شده است ولى به علت اينکه ديرتر از موقع اين عمل انجام پذيرفته است عوامل باکتریایى توکسين زا وارد عمل شده اند.
- ۳- **حجم زياد رحم.**
- ۴- **باز بودن سرویکس و دخول عوامل عفونى.**
- ۵- **استرس ناشى از زايمان.**
- ۶- **دستکاريهاى بيش از حد و نامناسب.**

علائم متريت عفونى:

متريت عفونى معمولاً در فاصله زمانى ۱۰-۱ روز بعد از زايمان رخ مي‌دهد. در اين بيمارى گاهى تب ديده ميشود که البته ملاک خوبى جهت تشخيص نيست زيرا بعد از Intoxication، درجه حرارت طبيعى و گاهى کمتر از حد طبيعى ميشود.

علائم ديگر عبارتند از بى اشتهاى و کاهش سريع وزن بدن (در عرض ۲۴ ساعت)، کاهش توليد شير، گود افتادن چشمها، خروج ترشحات صورتى- قرمزروشن و تيره

از دستگاه تناسلی (مخصوصاً پس از توشه رکتال)، کبودی و سیانوزه شدن و نازکی دیواره رحم که حالت تونیسیته خود را از دست داده است، گیج و بهت زده گی (Dull) حیوان و بی توجهی آن نسبت به محیط اطراف، لرزش، لنگش و گرفتن حالت کمانی (به علت زورزدن). از جمله باکتری هایی که در بوجود آمدن این بیماری نقش بسزایی دارند می‌توان به کلی فرمها، استرپ ها، استافهای همولیتیک، کورینه باکتریوم رناله و سودوموناسها اشاره نمود.

درمان متريت عفونی:

در درمان متريت بايد توجه داشت که در داخل رحم تجمعی از توکسینها را داریم در نتیجه نبايستی هیچ آسیبی به دیواره رحم وارد شود. استراتژی درمان به صورت زیر می‌باشد:

۱. خروج ترشحات توکسین:

این ترشحات در ابتدا می‌بایست رقیق شوند و سپس اقدام به خارج نمودن آنها کرد. بهترین مایع رقیق کننده استفاده از محلول سالین نرمال گرم (به اندازه دمای بدن) به همراه یک ماده آنتی سپتیک می‌باشد.

۲. آنتی بیوتیک تراپی:

معمولاً از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف مانند ترکیب پنی سیلین- استرپتومایسین و یا اکسی تتراسیکلین یا سولفانامیدها به صورت تزریقی استفاده می‌کنند. در درمان متريت عفونی هیچگاه از آنتی بیوتیکهای داخل رحمی استفاده نمی شود زیرا بی فایده می‌باشند.

۳. درمانهای حمایتی:

درمانهای حمایتی شامل حمایت کبدی بوسیله تجویز سرم قندی و یا مواد قندی - تجویز ویتامینها و کلسیم، فسفر و منیزیم میباشد.

همچنین جهت رفع حالت آتونسیسته رحم و شل نمودن سرویکس، می توان از تجویز **استرادیول** به صورت تزریقی استفاده نمود. دوز معمول آن ۶-۴ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن میباشد که در دوزهایی با فاصله زمانی (به مدت ۱-۲ روز) استفاده میشود.